

AK-LOMMETIPS



Patienter der skal henvises til egen læge eller Hjerteklinikken:

Alle, som er **ny-ordinerede i AK-behandling** med præparaterne:

- Marevan
- Eliquis – Xarelto – Pradaxa – Lixiana
- Lavmolekylært heparin

Der kan henvises patienter med:

- Opstart af Marevan og Fragmin
- Dysreguleret INR
- Skift fra en AK-type til en anden

DOAK (=NOAK) må ikke anvendes til:

Mekaniske hjerteklapper –
mitralstenose (kun moderat og svær) – svært
nedsat nyrefunktion – graviditet og amning –
antifosfolipidsyndrom.

5 punkter du skal overveje forud for ordination af AK-behandling:

1. Indikation
2. Kontraindikation
3. Dosering
4. Interaktion
5. Opfølgning



Husk - stillingtagen til varighed af AK-behandling.

AK-LOMMETIPS

Skal patienten følges med sin AK-behandling:

Husk at lave aftale herom **inden** udskrivelse.

Når der ordineres Marevan:

- Vær opmærksom på compliance
- Kan patienten komme til INR kontrol ved egen læge

OBS! Afdelingen har et lager af forfyldte Fragmin sprøjter i alle styrker, der skal udleveres mindst 10 stk. ved udskrivelse, derefter udfyldes recept på videre behandling, som Faxes.

Kontakt gerne Koordinator på afdelingen for yderligere spørgsmål på tlf. 21805.



Se mere på:

AK-behandling.rm.dk